



<i>Myotis sp.</i>	Murin indéterminé								1	2
<i>Sp.</i>	Chauves-souris indéterminées									
<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux				1					1
<i>Plecotus sp.</i>	Oreillard indéterminé									
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>117</b>

<b>Total espèces annexe II Directive européenne</b>	4	4	4	5	4	4	4	5	5
<b>Total individus annexe II Directive européenne</b>	27	57	50	84	83	91	96	88	100
<i>Myotis myotis</i>	1	5	3	2	3	4	3	1	1
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	2	1	3	3	6	5	6	9	5
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	20	34	21	42	34	45	42	36	25
<i>Myotis emarginatus</i>	4	17	23	36	40	37	45	40	67
<i>Myotis bechsteinii</i>	0	0	0	1	0	0	0	2	2

Rappelons que la détermination jusqu'à l'espèce de quelques chauves-souris en hibernation ne peut être attestée (certains critères déterminants non visibles).

Sous la dénomination de Murin à moustaches (noté *M. cf mystacinus*) se regroupe en fait un complexe de trois espèces *Myotis mystacinus*/*Myotis brandtii*/*Myotis alcathoe* (Murin à moustaches proprement dit, Murin de Brandt et Murin d'Alcathoe). En effet, ces trois espèces présentes en Picardie sont très proches morphologiquement. Notons que parmi ce groupe d'espèces, *Myotis mystacinus* est de loin celle qui semble la plus représentée.

